

Alternative Gewinnungsgebiete

1. Tiefenwasserentnahme
2. Perach Innauen
3. Alzuferfiltrat Daxentaler Forst
4. Weilharter Forst
5. Brunnen Burghausen
6. Werfenau
7. Raitenhaslach
8. Schelleneck
9. Forstbereich Heigermoos
10. Vorbehaltsgebiet Palling
11. Vorbehaltsgebiet Feichten/ Kirchweidach
12. Alzuferfiltrat Brandstett (bei Hirten)
13. Garching
14. Eigelwald
15. Mauerberg/Hohholz (Mörntal)
16. Tüßling/ Polling
17. Tüßling/ Hochholz




Studie zur Sicherung der
Trinkwasserversorgung


Anlage V

Übersichtskarte Geologie mit
Legende

Maßstab 1:100.000



0 3 6 km


















































Legende

Haupteinheiten GK25

LE-Name

	Auenscotter
	Jüngere Auenablagerungen (Jüngere Postglazialterrasse 2°1)
	Jüngere Auenablagerungen (Jüngere Postglazialterrasse 2°2)
	Jüngste Auenablagerungen (Jüngere Postglazialterrasse 3)
	Sinterkalk
	Sinterkalkstein (Kalktuff)
	Abschlämmassen (Kolluvium) der Würmmoräne
	Anmoor
	Anmoor oder Torf
	Anmooriger Boden, Vernässung
	Auenablagerungen
	Bachschwemmkegel
	Blockschutt
	Flussschotter, altholozän (Ältere Postglazialterrasse)
	Flussschotter, mittelholozän (Mittlere Postglazialterrasse 1)
	Flussschotter, mittelholozän (Mittlere Postglazialterrasse 2)
	Flussschotter, mittelholozän (Mittlere Postglazialterrasse)
	Flussschotter
	Hang- und Verwitterungsschutt
	Hangschutt
	Hochmoor

	Hochmoortorf
	Jüngere Auenablagerungen (Jüngere Postglazialterrasse 2)
	Künstlich verändertes Gelände
	Künstliche Ablagerungen
	Künstliche Aufschüttung oder stark verändertes Gelände
	Niedermoorortf
	Schwemmkegel oder Schwemmfächer
	Talboden und Seeverlandung
	Talboden und jüngste Ablagerungen
	Ältere Auenablagerungen (Jüngere Postglazialterrasse 1)
	Übergangsmoorortf
	Schotter der mittleren Postglazialterrasse
	Schotter der oberen Postglazialterrasse
	Schotter der tieferen Postglazialterrasse
	Ablagerungen der jüngeren Auenstufe
	Ablagerungen der jüngsten Auenstufe
	Ablagerungen der älteren Auenstufe
	Anmooriger Boden
	Künstlich verändertes Gelände
	Schmelzwasserschotter, günzzeitlich (Tieferer Älterer Deckenschotter)
	Fließerde (mit Periglazialschotter), z.T. Lößlehmfließerde
	Flussschotter, mindelzeitlich; "Deckenschotter", Nagelfluh
	Flussschotter, rißzeitlich; Hochterrassenschotter, z.T. Nagelfluh

	Lößlehm
	Moräne, günzzeitlich
	Moräne, günzzeitlich, über Flussschotter, günzzeitlich (z.T. Nagelfluh)
	Moräne, mindelzeitlich (i.w.S.), Nagelfluh
	Moräne, rißzeitlich, mit Wallform, z.T. Nagelfluh
	Schwemmfächer, rißzeitlich
	Seeton, (?) spätgünzzeitlich
	Seeton, (?) spätmindelzeitlich
	Toteisloch in Altmoräne
	Moräne, z. T. unter flacher Rißmoränenüberdeckung
	Vorstoßschotter und Jüngerer Deckenschotter
	Geschiebemergel des "Günz (2)"
	Moräne allgemein und Schottermoräne des "Günz (2)"
	Seeablagerungen (spätglazial?) des "Günz (2)"
	Beckenablagerungen, hochwürmzeitlich
	Beckenablagerungen, spätwürmzeitlich
	Fließerde
	Löß oder Lößlehm
	Lößlehm
	Moräne, würmzeitlich
	Schmelzwasserschotter, hochwürmzeitlich (Niederterrasse 1°1)
	Schmelzwasserschotter, hochwürmzeitlich (Niederterrasse 1°2)
	Schmelzwasserschotter, hochwürmzeitlich (Niederterrasse 2)
	Schmelzwasserschotter, hochwürmzeitlich

Legende

(Niederterrasse 3)		Toteisloch und -senke in Moränen oder in Schmelzwasserschotter		Hochterrassen- bzw. Vorstoßschotter der Kirchweidacher Phase, Riß (1), und des Frühhaptriß
 Schmelzwasserschotter, hochwürmzeitlich (Niederterrasse)	 Vorstoßschotter, hochwürmzeitlich			
 Schmelzwasserschotter, spätwürmzeitlich (Spätglazialterrasse 1)	 Moräne (Unterweißenkirchener Phase der Salzachgletscher-Gliederung)			 Hochterrassen- bzw. Vorstoßschotter der Tyrlachinger Phase, Riß (2)
 Schmelzwasserschotter, spätwürmzeitlich (Spätglazialterrasse 1°1)	 Moräne allgemein			 Hochterrassenschotter der Spätriß?
 Schmelzwasserschotter, spätwürmzeitlich (Spätglazialterrasse 1°2)	 Niederterrassenschotter (Neustadler Stufe) wechselnd mit autochthonen Talablagerungen im Schabinger Tal			 Moräne allgemein und bindig
 Schmelzwasserschotter, spätwürmzeitlich (Spätglazialterrasse 1°3)	 Prätwürmzeitliche Ablagerungen			 Reste autochthoner Talböden?
 Schmelzwasserschotter, spätwürmzeitlich (Spätglazialterrasse 1°4)	 Schotter der jüngeren Spätglazialterrassen			 Schottermoräne mit Wallform
 Schmelzwasserschotter, spätwürmzeitlich (Spätglazialterrasse 2)	 Schotter der älteren Spätglazialterrassen			 Seetone des Spätrißglazials (?)
 Schmelzwasserschotter, spätwürmzeitlich (Spätglazialterrasse 2°1)	 Spätglaziale Seesedimente, terrassiert			 Niederterrassenschotter
 Schmelzwasserschotter, spätwürmzeitlich (Spätglazialterrasse 2°2)	 Spätglaziale Seetone			 Hangablagerungen
 Schmelzwasserschotter, spätwürmzeitlich (Spätglazialterrasse)	 Spätglaziales Delta			 Abschwemm Massen
 Vorstoßschotter, hochwürmzeitlich	 Vorstoßschotter			 Bach- oder Flussablagerungen
 Endmoräne bzw. Rückzugsmoräne, würmzeitlich, mit Wallform	 Grundmoräne			 Lehm, umgelagert
 Flußschotter, hochwürmzeitlich; Niederterrassenschotter	 Moräne, ungegliedert			 Rutschmasse
 Flußschotter, spätwürmzeitlich	 Schmelzwasserschotter und Schotterfluren			 Talfüllung, polygenetisch
 Moräne, würmzeitlich, mit Drumlin	 Schottermoräne, örtlich von Grundmoräne bedeckt			 Seeton
 Moräne, würmzeitlich, mit Wallform	 Vorstoßschotter z. T. verfestigt, Schotter			 Ablagerungen der autochthonen Täler
Schwemmfächer, spätwürmzeitlich	 Beckenablagerungen, rißzeitlich			 Schwemmfächer
	 Moräne, mindelzeitlich (i.w.S.)			 Tone bis Mergel der Oberen Süßwassermolasse
	 Schmelzwasserschotter, mindelzeitlich (i.w.S.) (Jüngerer Deckenschotter)			 Quarzkonglomerat
	 Schmelzwasserschotter, rißzeitlich (Hochterrasse oder Vorstoßschotter)			 Sand
	 Schmelzwasserschotter, rißzeitlich (Tiefere Hochterrasse)			 Südliche Vollschocter-Abfolge
	 Moräne, rißzeitlich			 Südlicher Vollschocter (i. e. S.)
				 Feinsediment
				 Hangendserie
				 Jüngere Obere Süßwassermolasse
				 Mergel
				 Sand

Legende

-  Sand-Schotter-Wechselfolge
-  Schotter
-  Glaukonitsande und Blättermergel (Obere Meeresmolasse)
-  Quarzrestschotter
-  Fluviale Süßwasserschichten
-  Glaukonitsand und Blättermergel
-  Glimmersandbereich
-  Limnische Süßwasserschichten
-  Mehlsandbereich
-  Obere Meeresmolasse
-  Schillsandbereich
-  Gewässer
-  Keine Daten - Gebiet außerhalb Bayerns